Übungsaufgaben zur Vorlesung
Lineare Algebra und Analytische Geometrie I

Übungsserie 8

Abgabe am 12. 12. 2012

Bitte lösen Sie jede Aufgabe auf einem separaten Blatt. Geben Sie auf jedem Blatt gut lesbar Ihren Namen, die Matrikelnummer und Ihre *Übungsgruppe* (Namen des Übungsleiters) an.

Achten Sie auf gut nachvollziehbare Darstellungen der Lösungs- bzw. Beweisschritte.

- (a) Weisen Sie mithilfe der Vektorraumaxiome und der Folgerungen F1-F3 nach:
 Für jeden Vektor $\vec{u}$ ist der Gegenvektor $-\vec{u}$ eindeutig bestimmt. 2 Pkt.
 (b) Weisen Sie nach, dass in jedem Vektorraum V für alle $\vec{u}, \vec{v} \in V$ und alle $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$ gilt:
 Falls $\mu \cdot \vec{u} = \lambda \cdot \vec{u}$ und $\vec{u} \neq \vec{0}$, so ist $\mu = \lambda$. 2 Pkt.

- Weisen Sie für beliebige Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ (mit $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$) eines Vektorraumes V nach:
 - Ist $\vec{a}$ kein Vielfaches von $\vec{b}$ (existiert also kein $r \in \mathbb{R}$ mit $\vec{a} = r\vec{b}$) und gilt $\vec{d} = \lambda \vec{a} + \mu \vec{b}$, so ist $\lambda = \mu = 0$. 2 Pkt.
 - Ist $\vec{a}$ kein Vielfaches von $\vec{b}$ und lässt sich ein Vektor $\vec{c}$ als Linearkombination von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ darstellen, so ist diese Darstellung eindeutig, d. h. aus $\vec{c} = \lambda_1 \vec{a} + \mu_1 \vec{b}$ und $\vec{c} = \lambda_2 \vec{a} + \mu_2 \vec{b}$ folgt $\lambda_1 = \lambda_2$ und $\mu_1 = \mu_2$. 2 Pkt.

- (a) Für ein beliebiges (aber festes) $n \in \mathbb{N}$ ist die Menge

$$P_n = \left\{ p \mid p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k; a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}; x \in \mathbb{R} \right\}$$

der Polynome höchstens n -ten Grades mit den durch

$$(p+q)(x) := p(x) + q(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + \sum_{k=0}^n b_k x^k = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k$$

$$(\lambda \cdot p)(x) := \lambda \cdot p(x) = \lambda \cdot \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^n \lambda a_k x^k$$

gegebenen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ ein Vektorraum. (Dies müssen Sie nicht beweisen.)

Warum ist für $n \geq 1$ die Menge aller Polynome *genau* n -ten Grades *kein* Vektorraum? Geben Sie mindestens drei Stellen der Definition des Begriffs Vektorraum an, die hierbei verletzt würden. 2 Pkt.

- Formulieren und beweisen Sie (mithilfe von Vektoren) die *Umkehrung* des Satzes:
In jedem Parallelogramm halbieren die Diagonalen einander. 3 Pkt.

- Die Seiten eines Dreiecks ΔABC werden durch drei Punkte T_a, T_b und T_c jeweils in demselben Verhältnis $1:m$ ($m \in \mathbb{R}, m > 0$) geteilt.

- Zeigen Sie, dass der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden des Dreiecks $\Delta T_a T_b T_c$ mit dem Schnittpunkt der Seitenhalbierenden des Dreiecks ΔABC identisch ist (und somit beide Dreiecke denselben Schwerpunkt besitzen). 3 Pkt.

- Bestimmen Sie für $m=2$ die Verhältnisse, in denen die Strecken AT_a und CT_c einander teilen.

Hinweis: Nutzen Sie den Ansatz $\vec{AS} = \lambda \vec{AT}_a, \vec{CS} = \mu \vec{CT}_c$ und drücken Sie die Vektoren $\vec{AT}_a$ und $\vec{CT}_c$ als Linearkombinationen von $\vec{AB}$ und $\vec{AC}$ aus. Mittels $\vec{AS} = \vec{AC} + \vec{CS}$ erhalten Sie eine Darstellung für $\vec{AS}$, in der μ auftritt. Ermitteln Sie λ und μ durch Koeffizientenvergleich (siehe Aufgabe 2b).

4 Pkt.